

**KIRURGIA ETA PROZEDURA INBADITZAILEAK TRATAMENDU
ANTIAGREGATZAILEA DUTEN GAIKOAK DIRENEAN
CIRUGIA Y PROCEDIMIENTOS INVASIVOS EN PACIENTES CON T^o
ANTIAGREGANTE**

Antiagregatzaile plaketarioak plaketen ohiko funtzionamendua eragozten duten sendagaiak dira. Koagulazio-sistemak behar bezala ez funtzionatzea eragiten dute, horregatik, tronbosia prebenitzen dute horretarako joera duten gaixoengan (bihotzeko arazoak dituzten gaixoak, arazo baskularrak dituztenak,...).

Gehien erabiltzen diren antiagregatzaileen izen komertzialak hauexek dira: ASPIRINA, AAS, TROMALYT, ASASANTIN, PERSANTIN, TIKLID, TICLODONE, DISGREN, PLAVIX, ISCOVER, ...

Ebakuntza kirurgikoa edo odoljariora eragin dezakeen prozedura egin behar dizutenez, ezinbestekoa da zure koagulazio-sistemak behar bezala funtzionatzea; horregatik, ebakuntzaren eguna jakin bezain laster, hauxe egin behar duzu:

- EBAKUNTZA BAINO 5 EGUN LEHENAGO ANTIAGREGATZAILEA HARTZEARI UTZI (TIKLID, PLAVIX, TICLODONE ETA ISCOVER HARTZEN ARI BAZARA IZAN EZIK; HORIEK EBAKUNTZA BAINO 8-10 EGUN LEHENAGO UTZI BEHAR DITUZU)
- EBAKUNTZAREN AURREKO EGUNETIK (EBAKUNTZA BAINO 12 ORDU LEHENAGO) ETA ONDOKO EGUNETAN, BERRIRO ANTIAGREGATZAILEA HARTZEN HASI ARTE, PRESTAKIN HAUETAKOREN BATEN INJEKZIOA JARRIKO DIZUTE LARRUAZALPEAN: CLEXANE 40 MG, HIBOR 3.500 UI 0,4ML, FRAXIPARINA 0,4 CC, FRAGMIN 5.000 U EDO ANTZEKOAK.

Horretarako, ebakuntzaren eguna jakin bezain laster, zure familiako medikuari gomendio hauek erakutsi behar dizkiozu tratamendua koordinatzea.

Edonola ere, gerta ditekete tratatzen zaituen sendagileak jarraibide hauek aldatzea, tratamendua zure kasura egokitzeko.

Los antiagregantes plaquetarios son medicamentos que inhiben el funcionamiento normal de las plaquetas haciendo que su sistema de coagulación no funcione de modo óptimo, previniendo así la aparición de trombosis en pacientes con predisposición a padecerlas (pacientes con problemas cardiacos, vasculares, etc..).

Los nombres comerciales de los más utilizados son: **ASPIRINA, A.A.S., TROMALYT, ASASANTIN, PERSANTIN, TIKLID, TICLODONE, DISGREN, PLAVIX, ISCOVER, etc.**

Como usted va a ser sometido a una intervención quirúrgica o procedimiento con riesgo de sangrado, es necesario que su sistema de coagulación funcione correctamente, por lo que debe seguir, en cuanto sepa la fecha de la intervención, la siguiente pauta:

- SUSPENDERA LA TOMA DEL ANTIAGREGANTE 5 DÍAS ANTES DE LA INTERVENCION (SALVO EN LOS CASOS DE TIKLID, PLAVIX, TICLODONE, ISCOVER EN CUYO CASO LO SUSPENDERA 8-10 DIAS ANTES DE LA INTERVENCION)
- SE ADMINISTRARÁ DESDE EL DIA ANTERIOR DE LA INTERVENCION (12 HORAS ANTES DE ESTA) Y LOS DIAS SIGUIENTES HASTA QUE REINICIE LA TOMA DEL ANTIAGREGANTE UNA INYECCION SUBCUTANEA DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTESPREPARADOS: CLEXANE 40 MG, HIBOR 3.500 UI 0,4ML, FRAXIPARINA 0,4 CC, FRAGMIN 5.000 U O SIMILARES.

Para ello mostrará estas recomendaciones a su médico de atención primaria cuando sepa la fecha de su intervención para coordinar el tratamiento.

De todas formas en algunas ocasiones estas pautas podrán ser modificadas por el médico que le trate para adecuar el tratamiento a cada caso personal.