



SOFOSBUVIR/VELPATASVIR (Epclusa®)

Zer da eta zertarako erabiltzen da?

C hepatitis kronikoa daukaten paziente helduen tratamendurako agintzen da Epclusa® (sofosbuvir/velpatasvir).

Nola kontserbatu behar da?

Giro-tenperaturan kontserbatu behar da (<25°C), berak dakarren ontzian.

Nola hartzen da?

EPCLUSA®: egunean behin konprimitu bat hartzea da dosi gomendatua, janariarekin edo barik. Ez dira apurtu edo birrindu behar konprimituak.

Zer egin behar da dosi bat hartzea ahaztuz gero?

- **18 orduetik behera** pasatu badira: EPCLUSA®-en dosia alait arinen hartu eta hurrengo dosia ohiko orduan hartu behar da.
- **18 orduetik gora** pasatu badira, EPCLUSA®-en dosi hori ez hartu eta hurrengo dosia ohiko orduan hartu.

Ez hartu inoiz dosi bikoitzik ahaztutakoa konpentsatzeko.

Konprimitua hartu eta 3 orduko tartean botaka eginez gero, beste konprimitu bat hartu beharra dago. 3 orduetik gora pasatu badira, ez dago zertan beste dosirik hartu.

Zeintzuk dira tratamenduan zehar ager daitezkeen albo-ondorio ohikoenak?

Ez du esan nahi agertuko direnik, baina medikuari edo farmazialariari jakinarazi behar zaio nabaritzuz gero. Zefalea, nekea eta goragaleak dira albo-erreakzio ohikoenak.

Oharra

Zenbait medikamentuk eragina eduki dezakete tratamendu honetan. **Beraz, hartzen ari zaren medikamentu, osagarri dietetiko edo produktu natural guztien berri eman medikuari edo farmazialariari.**

¿Qué es y para qué se utiliza?

Epclusa® (sofosbuvir/velpatasvir) está indicada para el tratamiento de pacientes adultos con hepatitis C crónica.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (<25°C). Conservar en el envase original.

¿Cómo se administra?

EPCLUSA®: La dosis recomendada es de un comprimido una vez al día, con o sin alimentos. Los comprimidos no se deben romper ni triturar.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de olvido de una dosis:

- Si han pasado **menos de 18 horas:** tomar la dosis de EPCLUSA® lo antes posible y después tomar la siguiente dosis a la hora habitual.
- Si han pasado **más de 18 horas:** no tomar esa dosis de EPCLUSA® y tomar la siguiente a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

En caso de vomitar en plazo de 3 horas después de tomar el comprimido, se debe tomar un comprimido adicional. Si han transcurrido más de 3 horas, no hace falta tomar ninguna dosis adicional.

¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante el tratamiento?

No significa que vaya a padecerlos todos, pero debe conocerlos para informar a su médico o farmacéutico si los padece.

Las reacciones adversas más frecuentes son cefalea, fatiga y náuseas.

Observación

Ciertos medicamentos pueden interferir con este tratamiento. **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos, suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando.**



EPCLUSA® haurdunaldian hartzeari buruzko daturik ez dagoenez, ez da erabili behar haurdun egonez gero. Eskura dauden datuen arabera, medikamentu hori esnearen bidez igortzen da; beraz, ez da erabili behar bularra ematen egonez gero.

Tratamenduan zehar haurdun geratuz gero, berehala jakinarazi behar zaio medikuari.

Bularra emateari utzi behar zaio tratamendua hasi aurretik.

AHOLKUAK

Beste medikamenturen bat hartzen ari bazara edo duela gutxi hartu baduzu, mediku edo farmazialariari jakinarazi, errezetik gabekoak badira ere. Ahalkoldun edariak eragina izan dezakete zenbait medikamentuekin batera hartuta; nahigabeko ondorioak edo arrikutsuak ere sorrarazi ditzakete.

Urgentziazko egoera edo kirurgia arin baten aurrean (dentista, adibidez), hartzen ari zaren medikamentu guztien berri eman behar duzu.

Larrialdi Zerbitzura joan edo ospitaleratu beharrean egonez gero, aldean eroan behar duzu medikazioa. Garrantzitsua da ohiko moduan hartzea.

Umeez ez ikusteko eta ez hartzeko moduan gorde behar dituzu medikamentuak. Ez da medikamentua hartu behar iraungitze-data gaindituz gero (ontzian adierazitako hilabetearen azken egunetik aurrera). Medikamentuak soberan badituzu, ez gorde etxean. Itzuli mesedez Farmaziako Zerbitzuari.

No existen datos sobre el uso de EPCLUSA® durante el embarazo, por tanto, no debe utilizarse durante el embarazo. Los datos disponibles sugieren que este medicamento se excreta en la leche, por lo que no debe utilizarse durante la lactancia.

Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Suspenda la lactancia antes de empezar el tratamiento.

CONSEJOS

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Las bebidas alcohólicas pueden interactuar con algunos medicamentos y producir efectos no deseados o incluso peligrosos.

En cualquier situación de urgencia o cirugía leve (por ejemplo, el dentista) es necesario informar al médico de todos los medicamentos que está tomando.

Si acude a un servicio de urgencias o ha de ser ingresado en un hospital, lleve consigo la medicación. Es importante que la siga tomando de forma regular.

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños. No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase). Si le sobran medicamentos, no los guarde en su casa. Devuélvalos por favor en el servicio de farmacia.