



LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR (Harvoni®) ERRIBABIRINA

Zer da eta zertarako erabiltzen da?

C hepatitis kronikoa daukaten paziente helduen tratamenduan erabiltzen da **Harvoni®** (LDV/SOF) Erribabirinarekin konbinatuta (1, 3, 4 genotipoetan).

Nola kontserbatu behar dira?

HARVONI®: giro-tenperaturaren kontserbatu behar da (<25°C), jatorrizko ontzian utzita.

ERRIBABIRINA: giro-tenperaturaren kontserbatu behar da (<25°C), jatorrizko ontzian utzita.

Nola hartzen da?

HARVONI®: egunero konprimitu bat hartzea da gomendioa, 90 mg/140 mg (LDV/SOF), jakiekin batera edo jakirik gabe.

Zapore mingotzekoa denez, konprimitua ez mamurtzea edo birrintzea da gomendioa.

Konprimitua hartu eta 5 ordu igaro aurretik botaka eginez gero, beste konprimitu bat hartu beharra dago. 5 orduetik gora igaro ostean eginez gero, ez da beste konprimiturik hartu behar.

ERRIBABIRINA: ahotik, birritan hartzen da (gosari eta afarian); janariarekin batera hartu behar da.

Zer egin behar da dosi bat hartzea ahaztuz gero?

HARVONI®:

- **18 orduetik behera** pasatu badira: **HARVONI®**-en dosia al bait arinen hartu eta hurrengo dosia ohiko orduan hartu behar da.

- **18 orduetik gora** pasatu badira, **HARVONI®**-en dosi hori hartu barik utzi eta hurrengo dosia ohiko orduan hartu behar da.

ERRIBABIRINA: dosia hartzea ahaztuz gero, ahalik eta arinen hartu; baina ez hartu denbora aldetik hurrengo dosia hurbilago badago ahaztutako dosia baino.

Ez hartu inoiz dosi bikoitzik ahaztutakoa konpentsatzeko.

Zeintzuk dira tratamenduan zehar ager daitezkeen albo-ondorio ohikoak?

Ez du esan nahi agertuko direnik, baina medikuari edo farmazialariari jakinarazi behar zaio ezer nabaritzuz gero:

¿Qué es y para qué se utiliza?

Harvoni® (LDV/SOF) en combinación con Ribavirina, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con hepatitis C crónica (genotipos 1, 3, 4).

¿Cómo se debe conservar?

HARVONI®: Conservar a temperatura ambiente (<25°C). Conservar en el envase original.

RIBAVIRINA: Conservar a temperatura ambiente (<25°C). Conservar en el envase original.

¿Cómo se administra?

HARVONI®: La dosis recomendada es un comprimido de 90 mg/140 mg (LDV/SOF) una vez al día, acompañado o no de alimentos.

Debido a su sabor amargo, se recomienda no masticar ni machacar el comprimido.

Si vomita en menos de 5 horas después de la administración, debe tomar un comprimido adicional. Si vomita 5 horas después de la administración, no hace falta ningún comprimido adicional.

RIBAVIRINA: Por vía oral, en dos tomas (desayuno y cena) y coincidiendo con la ingesta de alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

HARVONI®: en caso de olvido de una dosis:

- Si han pasado **menos de 18 horas**: tomar la dosis de **HARVONI®** lo antes posible y después tomar la siguiente dosis a la hora habitual.

- Si han pasado **más de 18 horas**: no tomar esa dosis de **HARVONI®** y tomar la siguiente a la hora habitual.

RIBAVIRINA: En caso de que se olvide una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido

¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante el tratamiento?

No significa que vaya a padecerlos todos, pero debe conocerlos para informar a su médico o farmacéutico si los padece:



HARVONI®: zefalea eta nekea dira albo-ondorio ohikoak.

ERRIBABIRINA: goragaleak, gorakoak, beherakoak, urdaileko molestiak, pisu- eta gose-galera, pruritoa, insomnioa, suminkortasuna, depresioa eta suizidio-ideiak eta jokabide bortitza ere bai, nekea eta ahuldadea (anemiaren ondorioz), bilirrubinaren eta azido urikoaren igoera. Fotosentikortasuna.

Oharra:

Zenbait medikamentu eragina eduki dezakete tratamendu honetan. **Beraz, hartzen ari zaren medikamentu, osagarri dietetiko edo produktu natural guztien berri eman behar diozu medikuari edo farmazialariari.**

Arreta handia jarri behar da harreman sexualetan, haurdun geratzeko aukera egonez gero betiere, erribabirina oso kaltegarria izan daitekeelako umekiarentzat. Antisorgailu eraginkorren bat erabili behar da tratamenduan zehar nahiz 7 hilabete gerora arte, gutxienez. Tratamendu-aldian haurdun geratuz gero, berehala jakinarazi behar zaio medikuari. Bularra emateari utzi behar zaio tratamendua hasi aurretik.

AHOLKUAK

Beste medikamenturen bat hartzen ari bazara edo duela gutxi hartu baduzu, mediku edo farmazialariari jakinarazi, errezetarik gabekoak badira ere. Alkoholdun edariek eragina izan dezakete zenbait medikamentuekin batera hartuta; ondorio nahigabeak edo arriskutsuak ere sorrazaiz ditzakete.

Urgentziazko egoera edo kirurgia arin baten aurrean (dentista, adibidez), hartzen ari zaren medikamentu guztien berri eman behar duzu.

Larrialdi Zerbitzura joan edo ospitaleratu beharrean egonez gero, aldean eroan behar duzu medikazioa. Garrantzitsua da ohiko moduan hartzea.

Eguzkipean ez egotea gomendatzen da eta eguzki-babes egokia erabiltzea.

Umeek ez ikusteko eta ez hartzeko moduan gorde behar dituzu medikamentuak. Ez da medikamentua hartu behar iraungitze-data gaindituz gero (ontzian adierazitako hilabetearen azken egunetik aurrera). Medikamentuak soberan badituzu, ez gorde etxean. Itzuli mesedez Farmazia Zerbitzuari.

HARVONI®: Las reacciones adversas más frecuentes son cefalea y fatiga.

RIBAVIRINA: náuseas, vómitos, diarrea, molestias gástricas, pérdida de peso y apetito, prurito, insomnio, irritabilidad, depresión e incluso ideas suicidas y comportamiento agresivo, cansancio y debilidad (como consecuencia de la anemia), elevación de la bilirrubina y del ácido úrico. Fotosensibilidad.

Observación:

Ciertos medicamentos pueden interferir con este tratamiento. **Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos, suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando.**

Se debe tener especial precaución en las relaciones sexuales, si existe riesgo de embarazo, ya que la ribavirina puede ser muy dañina para el feto. Se debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y al menos 7 meses después.

Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Suspenda la lactancia antes de empezar el tratamiento.

CONSEJOS

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Las bebidas alcohólicas pueden interactuar con algunos medicamentos y producir efectos no deseados o incluso peligrosos.

En cualquier situación de urgencia o cirugía leve (por ejemplo el dentista) es necesario informar al médico de todos los medicamentos que está tomando.

Si acude a un servicio de urgencias o ha de ser ingresado en un hospital, lleve consigo la medicación. Es importante que la siga tomando de forma regular.

Se recomienda evitar la exposición al solar empleando una adecuada protección solar.

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños. No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase). Si le sobran medicamentos, no los guarde en su casa. Devuélvalos por favor en el servicio de farmacia del mes indicado en el envase). Si le sobran medicamentos, no los guarde en su casa. Devuélvalos por favor en el servicio de farmacia.