

REPATHA 140mg pluma precargada®**Zer da eta zertarako erabiltzen da medikamentu hau?**

Hiperkolesterolemia eta dislipemia mistoaren tratamenduetan erabiltzen den medikamentua da Repatha®; era berean, hiperkolesterolemia familiar homozigotikoan ere erabiltzen da, estatina bidezko tratamenduak ez duenean k-LDL murriztea lortzen edo haiekiko intolerantzia edo kontraindikazioa dagoenean. Ebolokumab da daukan substantzia aktiboa.

Nola hartu behar da medikazioa?

Medikuak esango dizu zein den hartu beharreko dosi eta maiztasun zehatza.

Larruazalpetik hartzen da. Larruazalpeko injezioaren bidez ematen da Repatha®, abdomenean, izterrean edo besoaren goiko aldean jarrita. Txandakatu egin behar dira injektatzeko gunek eta, era berean, ez da jarri behar larruazala ukitu eta mina sentitzen den tokietan edo ubelduta, gorrituta edo gogortuta egonez gero. Repatha® ez da zain- edo muskulu-barnetik hartu behar. Aztertu egin behar da disoluzioa jarri aurretik.

Ez da disoluzioa injektatu behar partikularik badauka, zikin badago edo kolorea aldatuta badauka. Injezio-inguruneko minak gutxitzeko, luma aurrekargatuari giro-temperatura hartzen utzi ahal zaio (25 °C arte), injektatu aurretik. Luma aurrekargatuaren eduki osoa injektatu behar da. Eduki osoa dosi finkoa izateko dago diseinatuta luma aurrekargatua.

¿Qué es este medicamento y para qué se utiliza?

Repatha® es un medicamento indicado en el tratamiento del hipercolesterolemia y dislipemia mixta y en hipercolesterolemia familiar homocigótica, cuando el tratamiento con estatinas no consigue el objetivo de disminuir c-LDL, o exista intolerancia a o contraindicación a las mismas. Contiene como sustancia activa evolocumab.

¿Cómo debe administrarse la medicación?

Su médico le prescribirá su dosis y frecuencia exacta.

Vía subcutánea. Repatha® se debe administrar mediante inyección subcutánea en el abdomen, el muslo o la parte superior del brazo. Se deben alternar las zonas de inyección y descartar aquellas donde la piel presente dolor a la palpación o esté amoratada, enrojecida o dura. Repatha® no se debe administrar por vía intravenosa ni intramuscular. La solución se debe examinar antes de su administración.

No inyecte la solución si contiene partículas, o si está turbia o presenta algún cambio de color. Para evitar las molestias en la zona de inyección, deje que la pluma precargada alcance la temperatura ambiente (hasta 25 °C) antes de la inyección. Inyecte todo el contenido de la pluma precargada. La pluma precargada está diseñada para administrar todo el contenido como una dosis fija.

¿Qué debe hacer si se le olvida una dosis?

Si olvida administrarse una inyección, debe inyectarse la siguiente dosis de Repatha® **tan pronto como lo recuerde**. Después se administrará la siguiente dosis como habitualmente, como si no se hubiese olvidado una dosis. Nunca debe duplicar una dosis por olvido de la administración anterior.

**Zer egin dosi bat hartzea ahaztuz gero?**

Injekzio bat jartzea ahaztuz gero, **gogoratu bezain laster** jarri behar da Repatha®-ren hurrengo dosia. Hortik aurrera, ohiko dosia jarri behar da, ezer gertatu ez balitz bezala.

Nahiz eta aurrekoa ahaztu, ez da inoiz dosia bizkoiztu behar.

Zeintzuk dira medikamentu honek eragin ditzakeen albo-ondorioak?

Medikamentu guztiak bezala, Repatha®-k ere albo-ondorioak eragin ditzake, nahiz eta pertsona guztxi ez gertatu.

Jar zaitez berehala harremanetan medikuarekin honelakorik nabaritzen gero: erupzio larria, urtikaria edo alergia-erreakzioa; aurpegia, eskuak edo oinak handitzea; arnasa hartzeko edo irensteko zailtasuna; arnastutako egotea ariketa fisikoa egitean edo etzanda egotean.

Honakoak dira sarriago agertzen diren erreakzioak: **injekzio-ingurune**ko erreakzioak (mina, hantura, gorritzea edo azkura); larruazal-erupzioa; **arnasbideetako infekzioak** (gripea, nasofaringitisa, goiko traktuko arnasbideetako infekzioak); goragaleak, astralgia eta bizkarreko mina.

Nola kontserbatu behar da medikamentua?

Hozkailuan kontserbatu behar da (2-8°C), dakarren ontziaren barruan, argitasunetik babesteko. Ez da izoztu behar. Umeek ez ikusteko eta ez hartzeko moduan mantendu behar da.

Kontuan izan beharrekoak:

Kautxo naturalez eginda dago beirazko luma aurrekargatuaren orratzaren estalkia (latexaren eratorria da); beraz, alergia-erreakzioa sorraraz ditzake.

¿Qué efectos adversos puede producir este medicamento?

Al igual que todos los medicamentos, Repatha® puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas las sufren.

Póngase en contacto con su médico inmediatamente si nota cualquiera de los siguientes efectos: erupción grave, urticaria u otros signos de reacción alérgica; hinchazón de la cara, manos, pies; dificultad para respirar, tragar; falta de aliento al hacer ejercicio o al estar tumbado o hinchazón de pies.

Otras reacciones de mayor frecuencia son: **reacciones en el lugar de inyección** (dolor, hinchazón, enrojecimiento o picor); erupción cutánea; **infecciones respiratorias** (gripe, nasofaringitis, infecciones respiratorias del tracto superior); náuseas, artralgias y dolor de espalda.

¿Cómo conservar el medicamento?

Conservar en nevera (2-8°C) dentro de su embalaje original para protegerlo de la luz. No congelar. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Precauciones:

El capuchón de la aguja de la pluma de vidrio precargada está fabricado con caucho natural (un derivado del látex), que puede causar reacciones alérgicas.