

**OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR (Viekirax®)
DASABUVIR (Exviera®)****Zer da eta zertarako erabiltzen da?**

C hepatitis kronikoa daukaten paziente helduen tratamenduan erabiltzen da Viekirax® (OMV/PTV/rtv) eta Exviera® (DSV) arteko konbinazioa (1 eta 4. genotipoetan baino ez).

Nola kontserbatu behar dira?

VIEKIRAX®: giro-tenperaturan kontserbatu behar da (<25°C), jatorrizko ontzian utzita.

EXVIERA®: giro-tenperaturan kontserbatu behar da (<25°C), jatorrizko ontzian utzita.

Nola hartzen da?

VIEKIRAX®: gosarian konprimitu bi hartzea da dosi gomendatua –12,5 mg/75 mg/50 mg (OMV/PTV/rtv)–, beste jaki batzuekin batera hartuta.

EXVIERA®: egunean birritan 250 mg-ko konprimitu bat hartzea da dosi gomendatua, gosarian eta afarian, beste jaki batzuekin batera hartuta.

Osorik hartu behar dira konprimituak (birrindu, mamurtu edo disolbatu barik, adibidez).

Zer egin behar da dosi bat hartzea ahaztuz gero?

VIEKIRAX®:

- 12 ordutik behera pasatu badira: VIEKIRAX®-en dosia al bait arinen hartu eta hurrengo dosia ohiko orduan hartu behar da.

- 12 ordutik gora pasatu badira, VIEKIRAX®-en dosi hori hartu barik utzi eta hurrengo dosia ohiko orduan hartu behar da.

EXVIERA®: Viekirax®-ekin bezala egin behar da, baina 6 ordu kontuan hartuta, ez 12.

Ez hartu inoiz dosi bikoitzik ahaztutakoa konpentsatzeko.

Zeintzuk dira tratamenduan zehar ager daitezkeen albo-ondorio ohikoena?

Ez du esan nahi agertuko direnik, baina medikuari edo farmazialariari jakinarazi behar zaio ezer nabaritzuz gero:

¿Qué es y para qué se utiliza?

Viekirax® (OMV/PTV/rtv) en combinación con Exviera® (DSV), está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con hepatitis C crónica (solo para genotipos 1 y 4).

¿Cómo se debe conservar?

VIEKIRAX®: Conservar a temperatura ambiente (<25°C). Conservar en el envase original.

EXVIERA®: Conservar a temperatura ambiente (<25°C). Conservar en el envase original.

¿Cómo se administra?

VIEKIRAX®: La dosis recomendada es de dos comprimidos de 12,5 mg/75 mg/50 mg (OMV/PTV/rtv) al desayuno, acompañado de alimentos.

EXVIERA®: La dosis recomendada es de un comprimido de 250 mg dos veces al día (desayuno y cena), acompañado de alimentos.

Tomar los comprimidos enteros (por ej. no machacar ni masticar ni disolver el comprimido).

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

VIEKIRAX®: en caso de olvido de una dosis:

- Si han pasado menos de 12 horas: tomar la dosis de VIEKIRAX® lo antes posible y después tomar la siguiente dosis a la hora habitual.

- Si han pasado más de 12 horas: no tomar esa dosis de VIEKIRAX® y tomar la siguiente a la hora habitual.

EXVIERA®: Lo mismo que con Viekirax®, pero en vez de 12 horas teniendo en cuenta 6 horas.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante el tratamiento?

No significa que vaya a padecerlos todos, pero debe conocerlos para informar a su médico o farmacéutico si los padece:

VIEKIRAX® y EXVIERA®: La reacción adversa más frecuente es fatiga, astenia, náuseas, insomnio y prurito.



VIEKIRAX® eta EXVIERA®: nekea, astenia, goragaleak, insomnioa eta pruritoa dira albo-ondorio ohikoenak.

Oharra:

Zenbait medikamentuk eragina eduki dezakete tratamendu honetan. Beraz, hartzen ari zaren medikamentu, osagarri dietetiko edo produktu natural guztien berri eman behar diozu medikuari edo farmazialariari.

Viekirax/Exviera haurdunaldian hartzeari dagokionez, ez dago daturik handirik. Hala ere, egokiagoa da horrelakoetan ez erabiltzea, badaezpada ere; horregatik haurdun ez geratzeko neurriak hartzea da gomendioa.

AHOLKUAK

Beste medikamenturen bat hartzen ari bazara edo duela gutxi hartu baduzu, mediku edo farmazialariari jakinarazi, errezetarik gabekoak badira ere. Ahalkoldun edariek eragina izan dezakete zenbait medikamentuekin batera hartuta; nahigabeko ondorioak edo arrikutsuak ere sorrarazi ditzakete.

Urgentziazko egoera edo kirurgia arin baten aurrean (dentista, adibidez), hartzen ari zaren medikamentu guztien berri eman behar duzu.

Larrialdi Zerbitzura joan edo ospitaleratu beharrean egonez gero, aldean eroan behar duzu medikazioa. Garrantzitsua da ohiko moduan hartzea.

Umeek ez ikusteko eta ez hartzeko moduan gorde behar dituzu medikamentuak. Ez da medikamentua hartu behar iraungitze-data gaindituz gero (ontzian adierazitako hila betearen azken egunetik aurrera). Medikamentuak soberan badituzu, ez gorde etxean. Itzuli mesedez Farmaziako Zerbitzuari.

Observación:

Ciertos medicamentos pueden interferir con este tratamiento. Comuníquese a su médico o farmacéutico todos los medicamentos, suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando.

No hay datos o estos son limitados relativos al uso de Viekirax/Exviera en el embarazo y la lactancia. Como medida de precaución, es preferible evitar su uso en estas situaciones, y se recomienda tomar precauciones para evitar el riesgo de embarazo.

CONSEJOS

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Las bebidas alcohólicas pueden interactuar con algunos medicamentos y producir efectos no deseados o incluso peligrosos.

En cualquier situación de urgencia o cirugía leve (por ejemplo el dentista) es necesario informar al médico de todos los medicamentos que está tomando.

Si acude a un servicio de urgencias o ha de ser ingresado en un hospital, lleve consigo la medicación. Es importante que la siga tomando de forma regular.

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños. No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase). Si le sobran medicamentos, no los guarde en su casa. Devuélvalos por favor en el servicio de farmacia.