

**OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR (Viekirax®)  
ERRIBABIRINA (RIBAVIRINA)****Zer da eta zertarako erabiltzen da?**

C hepatitis kronikoa daukaten paziente helduen tratamenduan erabiltzen da Viekirax® (OMV/PTV/rtv) eta erribabirina arteko konbinazioa (4 genotipoan baino ez).

**Nola kontserbatu behar da?**

**VIEKIRAX®:** Giro-tenperaturan kontserbatu behar da (<25°C), jatorrizko ontzian utzita.

**ERRIBABIRINA:** Giro-tenperaturan kontserbatu behar da (<25°C), jatorrizko ontzian utzita.

**Nola hartzen da?**

**VIEKIRAX®:** Gosarian konprimitu bi hartzea da dosi gomendatua, beste jaki batzuekin batera hartuta. Konprimituak ez dira apurtu edo birrindu behar.

**ERRIBABIRINA:** aho bidezko bi hartualdi (gosari eta afarian), beste jaki batzuekin batera hartuta. Osorik hartu behar dira konprimituak (birrindu, mamurtu edo disolbatu barik, adibidez).

**Zer egin behar da dosi bat hartzea ahaztuz gero?****VIEKIRAX®:**

- **12 orduetik behera** pasatu badira: VIEKIRAX®-en dosia albaiz arinen hartu eta hurrengo dosia ohiko orduan hartu behar da.
- **12 orduetik gora** pasatu badira, VIEKIRAX®-en dosi hori hartu barik utzi eta hurrengo dosia ohiko orduan hartu behar da.

**ERRIBABIRINA:** dosia hartzea ahaztuz gero, ahalik eta arinen hartu; baina ez hartu hurrengo dositik hurbilago badago ahaztutako dositik baino.

hartsu inoiz dosi bikoitzik ahaztutakoa konpentsatzeko.

**Zeintzuk dira tratamenduan zehar ager daitezkeen albo-ondorio ohikoenak?**

Ez du esan nahi agertuko direnik, baina medikuari edo farmazialariari jakinarazi behar zaio nabarituz gero:

**VIEKIRAX® eta ERRIBABIRINA batera:** nekea, ahuldadea, goragaleak, insomioa eta hazkura dira albo-ondorio ohikoenak. Honakoak ere ager daitezke: anemia, bilirrubina igotzea, pisu- eta gose-galera. Fotosentikortasuna (erribabirina).

**¿Qué es y para qué se utiliza?**

Viekirax® (OMV/PTV/rtv) en combinación con Ribavirina, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con hepatitis C crónica (solo para genotipo 4).

**¿Cómo se debe conservar?**

**VIEKIRAX®:** Conservar a temperatura ambiente (<25°C). Conservar en el envase original.

**RIBAVIRINA:** Conservar a temperatura ambiente (<25°C). Conservar en el envase original.

**¿Cómo se administra?**

**VIEKIRAX®:** La dosis recomendada es de dos comprimido de 12,5 mg/75 mg/50 mg (OMV/PTV/rtv) con el desayuno. Los comprimidos no se deben romper ni triturar.

**RIBAVIRINA:** Por vía oral, en dos tomas (desayuno y cena) y coincidiendo con la ingesta de alimentos. Tomar los comprimidos enteros (por ej. no machacar ni masticar ni disolver el comprimido).

**¿Qué hacer si se olvida una dosis?**

**VIEKIRAX®:** en caso de olvido de una dosis:

Si han pasado **menos de 12 horas**: tomar la dosis de VIEKIRAX® lo antes posible y después tomar la siguiente dosis a la hora habitual.

Si han pasado **más de 12 horas**: no tomar esa dosis de VIEKIRAX® y tomar la siguiente a la hora habitual.

**RIBAVIRINA:** En caso de que se olvide una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

**¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante el tratamiento?**

No significa que vaya a padecerlos todos, pero debe conocerlos para informar a su médico o farmacéutico si los padece:

**VIEKIRAX® con RIBAVIRINA:** Las reacciones adversas más frecuentes son fatiga, debilidad, náuseas, insomnio y picores. También puede aparecer anemia, elevación de bilirrubina, pérdida de peso y apetito. Fotosensibilidad (ribavirina).



## Oharra

Zenbait medikamentuk eragina eduki dezakete tratamendu honetan. **Beraz, hartzen ari zaren medikamentu, osagarri dietetiko edo produktu natural guztien berri eman behar diozu medikuari edo farmazialariari.**

Arreta handia jarri behar dute emakume zein gizonek harreman sexualetan, haurdun geratzeko aukera egonez gero betiere, erribabirina oso kaltegarria izan daitkeelako umekiarentzat.

Antisorgailu eraginkorren bat erabili behar da tratamenduan zehar nahiz 7 hilabete gerora arte, gutxienez. Tratamendu-aldian haurdun geratuz gero, berehala jakinarazi behar zaio medikuari.

Bularra emateari utzi behar zaio tratamendua hasi aurretik.

## AHOLKUAK

Beste medikamenturen bat hartzen ari bazara edo duela gutxi hartu baduzu, mediku edo farmazialariari jakinarazi, errezeptarik gabekoak badira ere. Alkoholdun edariek eragina izan dezakete zenbait medikamentuekin batera hartuta; ondorio nahigabeak edo arriskutsuak ere sorrarazi ditzakete.

Urgentziazko egoera edo kirurgia arin baten aurrean (dentista, adibidez), hartzen ari zaren medikamentu guztien berri eman behar diozu medikuari.

Larrialdi Zerbitzura joan edo ospitaleratu beharrean egonez gero, aldean eroan behar duzu medikazioa. Garrantzitsua da ohiko moduan hartzea.

Eguzkipean ez egotea gomendatzen da eta eguzki-babes egokia erabiltzea.

Umeek ez ikusteko eta ez hartzeko moduan gorde behar dituzu medikamentuak. Ez da medikamentua haurt behar iraungitze-data gaindituz gero (ontzian adierazitako hilabetearen azken egunetik aurrera). Medikamentuak soberan badituzu, ez gorde etxeen. Itzuli mesedez Farmazia Zerbitzuari.

**Tratamendua egiten den bitartean nabaritzen den sintoma guztien berri eman behar zaie medikuari edo farmazialariari, behar diren neurriak har ditzaten.**

## Observación

Ciertos medicamentos pueden interferir con este tratamiento. **Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos, suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando.**

Tanto los hombres como las mujeres deben tener especial precaución en sus relaciones sexuales, si existe riesgo de embarazo, ya que la ribavirina puede ser muy dañina para el feto.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y al menos 7 meses después. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Suspenda la lactancia antes de empezar el tratamiento.

## CONSEJOS

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Las bebidas alcohólicas pueden interaccionar con algunos medicamentos y producir efectos no deseados o incluso peligrosos.

En cualquier situación de urgencia o cirugía leve (por ejemplo el dentista) es necesario informar al médico de todos los medicamentos que está tomando.

Si acude a un servicio de urgencias o ha de ser ingresado en un hospital, lleve consigo la medicación. Es importante que la siga tomando de forma regular.

Se recomienda evitar la exposición al solar empleando una adecuada protección solar.

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños. No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase). Si le sobran medicamentos, no los guarde en su casa. Devuélvalos por favor en el servicio de farmacia.

**Siempre hay que notificar al médico ó farmacéutico cualquier síntoma que se observe durante el tratamiento para que éste tome las precauciones adecuadas.**