



## GORPUTZ BEIRAKARAREN BARNEKO INJEKZIOA INYECCION INTRAVÍTREA

Gorputz beirakararen barneko injezioa egitea da interbentzio honen helburua.

EGUNA: \_\_\_\_\_

BERTARATZEKO ORDUA: \_\_\_\_\_

NORA JOAN: Oftalmologia-kontsulta, 2. Solairua,  
Ospitale Zaharra.

**Bi egun lehenagotik**, Oftacilox kolirioaren tanta bat eman behar duzu egunean hiru aldiz (gosaltzean, bazkaltzean eta afaltzean), injezioa jasoko duen begian. Injezioaren egunean ere eman behar duzu.

Injezioa eman eta gero, hiru egunez eman beharko duzu era berean.

Injezioa eman eta gero, ondoeza edo marruskadura txiki bat sentituko duzu begian.

Batzuetan, orban beltz txiki mugikor batzuk ikusten dira zenbait egunez.

Halaber, konturatuko zara begi hori gorriago jartzen dela, eta baliteke isuri bat sortzea (apurka-apurka desagertuko zaizu, egunak pasa ahala).

El objeto de esta intervención es realizar una inyección intravítrea.

DÍA: \_\_\_\_\_

ACUDIRÁ A ESTA HORA: \_\_\_\_\_

LUGAR: Consulta oftalmología. 2ª planta, Hospital Viejo.

Desde **dos días antes**, tendrá que aplicarse 1 gota de colirio Oftacilox 3 veces al día (desayuno, comida y cena), en el ojo en que se realizará la inyección y también a la mañana el día de la inyección.

Después de la inyección tendrá que aplicársela 3 días más de la misma forma.

Posteriormente a la inyección notará una leve molestia o roce en ese ojo.

En ocasiones se ven unas manchitas negras que se mueven durante unos días.

También verá que ese ojo se pone más rojo e incluso puede hacerse un derrame, que irá desapareciendo progresivamente en varios días.