



KATARATAREN KIRURGIAREN OSTEKO TRATAMENDUA Ttº POST-OPERATORIO CIRUGIA CATARATAS

1. ASTEAN: tanta 1 **TOBRADEX**, 3 ordurik behin
(lo-orduak errespetatuta)

Tanta 1 **YELLOX** gosarian eta
beste bat afarian

2. ASTEAN: tanta 1 **TOBRADEX**, egunean 3 bider
(gosari, bazkari eta afarian)

Tanta 1 **YELLOX** gosarian eta
beste bat afarian

3. ASTEAN: tanta 1 **TOBRADEX** egunean 2 bider
(gosarian eta afarian)

4. ASTEAN: tanta 1 **TOBRADEX** egunero
(gosarian)

- EZ UKITU EZ IGURTZI OPERATUTAKO BEGIA
- MALKOAK JAUSTEN UTZI ETA GASA EDO ZAPI GARBI BATEN BIDEZ SIKATU MASAILEAN
- OPERATU GABEKO ALDEAREN GAINEAN LO EGIN
- MINIK IZANEZ GERO, TERMALGIN 1 HARTU 8 ORDURIK BEHIN (aspirinarik ez)

Tantak aldi berean direnean, bata eta bestearen artean 5 minutu itxaron; ez du eraginik zein jartzen den arinago.

1ª SEMANA: 1 gota de **TOBRADEX** cada 3h.
(respetando las hora de sueño)

1 gota de **YELLOX**, en el desayuno
y otra en la cena

2ª SEMANA: 1 gota de **TOBRADEX** 3 veces al
día: desayuno – comida – cena

1 gota de **YELLOX** en el desayuno
y otra en la cena

3ª SEMANA: 1 gota de **TOBRADEX** 2 veces al
día (desayuno - cena)

4º SEMANA: 1 gota de **TOBRADEX** al día
(desayuno)

- NO TOCAR NI FROTAR EL OJO OPERADO
- DEJAR CAER LAS LÁGRIMAS Y SECARLAS EN LA MEJILLA CON UN PAÑUELO LIMPIO O UNA GASA.
- DORMIR SOBRE EL LADO NO OPERADO
- SI TIENE DOLOR, TOMAR 1 TERMALGIN CADA 8 HORAS (evitar la aspirina)

Cuando coincidan las gotas, espera 5 minutos entre una y otra sin importar el orden.