



YAG LASER BIDEZKO KAPSULOTOMIAREN OSTEKO TRATAMENDUA Ttº POST CAPSULOTOMIA CON LASER YAG

Jarraibide hauek bete behar dituzu, YAG laser bidezko kapsulotomia egin eta gero (begi barruko leiarra "garbitzea").

Bota itzazu jarraian azaltzen diren kolirioen tantak, nahi duzun hurrenkeran. Tanta bakoitza bota eta gero, begiak itxita eduki beharko dituzu, kliskatu gabe.

- **ALPHAGAN** kolirioa.
Tanta 1, egunean 2 bider (gosarian eta afarian), 2 egunez.

- **ACULAR** kolirioa
Tanta bat 4 bider egunean, (gosari, bazkari, askari eta afarian), astebetez.

Kontsultara etorri beharko duzu esaten dizuten egunean.

Siga las siguientes instrucciones necesarias tras la realización de capsulotomía con láser YAG ("limpieza" de la lente intraocular).

Aplique los colirios en el orden que prefiera y mantenga los ojos cerrados (sin pestañear) después de cada instilación.

- Colirio **ALPHAGAN**
1 gota 2 veces al día, durante 2 días (desayuno y cena)

- Colirio **ACULAR**
1 gota 4 veces al día, durante 1 semana (desayuno, comida, merienda y cena)

Acuda a la consulta en la fecha que se le haya facilitado.