

BAT-BATEKO GORRALDIA TRATATZEKO PROTOKOLOA
PROTOCOLO TRATAMIENTO SORDERA BRUSCA

“Bat-bateko hipoakusia tratatzeko bi protokoloen arteko alderaketa: estatistika-ikerketa eta emaitza klinikoak”, Pino Rivero, V et al. *Acata ORL Esp* 2005; 55: 63-67

✓ **ERASOA**

- **Seroterapia (fisiologikoa/ringer ;6 orduro; txandakatuz):**
2000 cc / 24 h / 4 egun
- **Metilprednisolona: 800 mg**
dosi bakar batean:
benabarnetik/24 h / 4 egun
- **Piracetam:**
3 anpoila benabarnetik/ 24 h / 4 egun
- **Pentoxifilina:**
300 gramoko anpoila bat serum bakoitzean/ 4 egun
- **Omeprazol:**
anpoila bat benabarnetik/ 24 h / 4 egun

✓ **EGOITZA**

- **Metilprednisolona edo deflazacort 30-60 mg,**
atsedena etengabeko
atsedena/ 10 egun
- **Piracetam: 2 pilula/ 8 h / 10 egun**
- **Pepntoxifilina: 2 pilula/ 8 h / 10 egun**

Pino Rivero, V et al. *Acata ORL Esp* 2005; 55: 63-67 “Estudio estadístico y resultados clínicos de la comparación de dos protocolos diferentes en el tratamiento de la hipoacusia brusca”

✓ **ATAQUE**

- **Sueroterapia (fisiológico/ringer**
alternando/6 h.):
2000 cc / 24 h / 4 días.
- **Metilprednisolona:**
800 mg en dosis única iv./ 24 h / 4 días
- **Piracetam:**
3 amp iv / 24 h. / 4 días
- **Pentoxifilina:**
1 amp de 300 mg en cada suero / 4 días
- **Omeprazol:**
1 amp iv /24h / 4 días

✓ **DOMICILIO**

- **Metilprednisolona o deflazacort 30-60 mg,** descanso progresivo / 10 días
- **Piracetam 2 comp / 8 h / 10 días**
- **Pepntoxifilina 2 comp / 8h / 10 días**