



ZEFALEA CEFALEA

Zure seme-alabak orain dauzkan sintoma eta ezaugarriak direla-eta, hauxe da diagnostikoa: **ZEFALEA**.

ZER DA?

Zefaleak buruko mina esan nahi du, eta eragileak garezur barruko edo kanpoko egiturak izan daitezke: *sinu paranasalak* (sinusitisa), *begiak*, *hortz-haginak*, *muskuluak*, *etab.* Gehienetan ezinezkoa da jakitea zein den buruko min hori eragiten duen gaixotasun edo anomalia; bai, ordea, umEEK edukitzen duten bi zefalea-motetan: **tentsio-zefaleak** (muskulu-uzkurdurek sortua, ezinegon- edo urduritasun-egoeretan) eta **jakekak** (familia-aurrekariak izan daitezke eragileak).

ZER EGIN DEZAKET NIRE UMEAK BURUKO MINA DAUKANEAN?

- Umeak ahalik eta erosoan egon beharko du: giro lasaia eta zaratarik gabea. Ume askok hobera egiten dute oheratzean, eta iluntasuna nahi izaten dute.
- Paracetamol edo ibuprofeno bezalako analgesikoek mina arin dezakete, ohiko dosietan.
- Saiatu beharko gara mina zerk sor dezakeen aurkitzen: urduritasun-egoerak, lo nahikorik ez egitea, ahalegin fisikoa, hilekoa, janari-mota batzuk (gaztak, jaki hotzak, gehigarri batzuk,...), baraua, sukarra, ikusmen-akatsak, etab.

ZERI JARRI BEHAR ZAION ARRETA

Pediatrari kontsultatu egin beharko diozu edo gure larrialdietako zerbitzuari, honelakorik agertuz gero:

- Sukarra badauka eta goibel badabil.
- Gorakoak behin eta berriro, batez ere "eskopetakada" badira, goragalerik gabe.
- Mina iraunkorra bada, egunerokoa eta gero eta biziagoa.
- Mina dela-eta, gaeuz esnatzen bada edo egiten ari dena eten behar izaten badu.
- Beste sintoma batzuk agertzen badira, adibidez ikusmenaren alterazioak edo jokaera-aldaketak, edo kezka sorrarazten dizun beste edozein sintoma.

Su hijo ha sido diagnosticado de **CEFALEA**, por los síntomas y signos que ahora presenta.

¿QUE ES?

El termino cefalea significa dolor de cabeza y puede estar causado por estructuras de dentro del cráneo o de fuera del mismo: *senos paranasales* (sinusitis), *ojos*, *dientes*, *músculos*, etc.. La mayoría de las veces no podemos encontrar una enfermedad o una anomalía que ocasione el dolor de cabeza como ocurre en las dos formas más frecuentes de cefaleas que padecen los niños: las **cefaleas tensionales** causadas por contractura muscular en situaciones de preocupación o nerviosismo, y las **jaquecas**, en las que suele existir una predisposición familiar.

¿QUE PUEDO HACER CUANDO MI HIJO TIENE DOLOR DE CABEZA?

- Se intentará buscar la comodidad del niño: ambiente tranquilo y sin ruido. Muchos niños mejoran al acostarse y buscan la oscuridad.
- Los analgésicos suaves como son el paracetamol o el ibuprofeno pueden calmar el dolor a las dosis habituales.
- Intentaremos averiguar si existe algo que desencadene los dolores como: situaciones de nerviosismo, falta de sueño, esfuerzo físico, menstruación, cierta clase de comidas (quesos, alimentos fríos, algunos aditivos...), ayuno, fiebre, defectos visuales, etc...

¿QUE DEBO VIGILAR?

Usted debe consultar con su pediatra o con nuestro servicio de urgencias si aparecen los siguientes síntomas:

- Fiebre y decaimiento,
- Vómitos repetidos, sobre todo si son "en escopetazo", sin náuseas.
- Si el dolor es persistente, diario, y aumenta progresivamente de intensidad.
- Si el dolor despierta al niño por las noches o impide que el niño continúe con la actividad que estaba haciendo.
- Si aparecen síntomas nuevos como alteraciones de la visión, cambios de comportamiento u otros síntomas que le preocupen.