

**PRONAZIO MINGARRIA
PRONACIÓN DOLOROSA**

Zerbitzu honetan zure seme-alabaren sintomak aztertuta, hauxe da diagnostikoa: **PRONAZIO MINGARRIA**.

ZER DA?

Lekuz aldatuta dago erradioa, ukondoko artikulazioko hezurretako bat, hain zuzen ere.

ZEIN DA HORREN ARRAZOA?

Hezur hau besoa zakartasunez luzatzeagatik gertatzen da, adibidez umea besoetatik jasotzean edo besoei tira egitean; bizitzako lehen urteetan gertatzen da, hiru urte eduki arte.

NOLA IGARRI AHAL DIOT?

Umeak luzatuta dauka besoa, gorputzaren ondoan, mugitu gabe, eta mina sentitzen du mugitzen saiatzen bada; ez du esku horrekin ezer hartu nahi.

ZERI JARRI BEHAR DIOT ARRETA?

- Pronazio mingarria arin eta erraz trata daiteke, gertatu eta gutxira egiten bada kontsulta. Hezurra bere lekura eramaten da, ukondoko giltzaduraren barruan, pediatrik egingo duen mugimendu erraz baten bidez.
- Hori egin eta gero, besoaren mugikortasuna berreskuratzen dute eta ez dute minik sentitzen; eskain iezaiozu zerbait esku horrekin har dezan, eta horrela mugimenduaren normaltasuna egiaztatuko duzu.
- Umeak besoa normaltasunez ez duela mugitzen nabaritzen baduzu, berriro joan beharko duzu larrialdietako zerbitzura edo osasun-zentrora, beste azterketa bat egin diezaioten.

Su hijo ha sido diagnosticado de **PRONACION DOLOROSA**, por los síntomas que presenta en el momento en que ha sido valorado en este Servicio.

¿QUE ES?

Es el desplazamiento de uno de los huesos, el "radio", que forma parte de la articulación del codo.

¿CUAL ES LA CAUSA?

La causa por la cual este hueso se sale de la articulación suele ser el estiramiento brusco del brazo, por ejemplo al levantar al niño por los brazos o tirar de él. Ocurre en los primeros años de vida, pudiendo repetirse hasta los tres años de edad.

¿COMO RECONOCERLA?

El niño mantiene el brazo estirado, pegado al cuerpo, inmóvil y además le duele al intentar moverlo, negándose a coger objetos con esa mano.

¿QUE DEBE VIGILAR?

- El tratamiento de la pronación dolorosa es rápido y fácil si se consulta poco después de haberse producido. Consiste en llevar el hueso a su sitio, dentro de la articulación del codo, con una maniobra sencilla que realizará el pediatra que le ve.
- Tras esto recuperan la movilidad del brazo en unos minutos y les deja de doler; ofrézcale cosas para que coja con esa mano y comprobar la normalidad del movimiento.
- Si nota que el niño continúa sin mover normalmente ese brazo deberá acudir de nuevo a un Servicio de Urgencias o a su Centro de Salud para volver a valorar.