



FLEBOGRAFIA

Goiko eta beheko gorputz-adarretako zainak aztertzea da **GORPUTZ-ADARREN FLEBOGRAFIA** egitearen helburua.

Azterketa hori egiteko iododun kontrastea injektatzen da: gainazaleko zain batetik, oingainean edo eskuan. (gorputz-adarra goikoa edo behekoa izatearen arabera).

Miaketan zehar, zenbait konpresio egiten dira gorputz-adarretan, aztertu beharreko lekua nolakoa den kontuan hartuta.

GERTA DAITEZKEEN KONPLIKAZIOAK

- Zain-barneko kontrasteak injektatzean, nahiko ohikoa da gorabeherak agertzea: **GORAGALEA, BERO-SENSAZIOA, AHOKO ZAPORE TXARRA**, edota **PIXA EGITEKO GOGOA**, besteak beste.
- **IODODUN KONTRASTEEI ALERGIA** edukiz gero, proba eskatu duen medikuari eta erradiologoari jakinarazi behar diezu.
- ZBKaren estrabasazioak eragin lokalak sor ditzake: **MINA, INFEKZIOA EDO AZAL-NEKROSIA**, adibidez.
- **ZAINEN TRONBOSI SAKONA** eragin dezake, narritaduragatik.
- **MEDIKAMENTUREN BATI ALERGIA** diozun ere esan beharko diezu (dokumentatua); izan ere, hala bada, medikazio bat hartu beharko duzu aurretik (guk emango dizugu).
- **GAIXOTASUNEN BAT** edukiz gero, jakinarazi behar da (bihotzekoa, giltzurrunetakoa, asma).
- **EZ DA PROBA EGIN BEHAR HAURDUN EGONEZ GERO, edo HORREN SUSMORIK EDUKIZ GERO**, erradiazio ionizatzailea erabiltzen delako.

PAZIENTEA PRESTATZEA

- **BARAURIK** joan behar zara.

BEREN BEREGI EMANDAKO BAIMENA

Praktika Kliniko Egokiak eta pazienteen eskubideen defentsa direla-eta, eskatzen dizugu idatziz adierazteko proba egiteko baimena ematen dizula. Beraz, proba egiteko eskatzen den egunean, **Baimen Informatua** emango dizute; eta hura sinatu ezean, ezingo da proba egin.

La **FLEBOGRAFÍA DE EXTREMIDADES** tiene como objetivo el estudio venoso de las extremidades superior o inferior.

Para su realización, se inyecta un medio de contraste yodado a través de una vena superficial, en el empeine o en la mano, según se estudie la extremidad inferior o superior.

A lo largo de la exploración se realizan diferentes compresiones en las extremidades según sea la zona a estudiar.

POSIBLES COMPLICACIONES

- Durante la inyección del contraste intravenosos, con cierta frecuencia, pueden aparecer **NAÚSEAS, SENSACIÓN DE CALOR, MAL SABOR DE BOCA, DESEOS DE ORINAR** u otros efectos anómalos.
- Deberá advertir al médico que solicita la prueba y al radiólogo si es Ud. **ALÉRGICO A LOS CONTRASTES YODADOS**.
- Efectos locales por extravasación de CIV como **DOLOR, INFECCION O NECROSIS DE PIEL**.
- Puede producir una **TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA** por irritación.
- También debe advertir si padece **ALGUNA ALERGIA MEDICAMENTOSA** (documentada), en cuyo caso deberá tomar una medicación previa, ya pautada, que se le facilitará.
- También notifique si padece **ALGUNA ENFERMEDAD CONOCIDA** (corazón, riñón, asma).
- Como en toda exploración que emplea radiación ionizante, **NO DEBERÁ SOMETERSE A ELLA SI ESTÁ EMBARAZADA O SUPONE ESTARLO**.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

- Deberá acudir **EN AYUNAS**.

AUTORIZACIÓN EXPRESA

Las Buenas Prácticas Clínicas y la defensa de los derechos de los pacientes nos obligan a solicitarle, por escrito, una autorización formal para poder realizarle la prueba. Por lo tanto, el día de la solicitud de la prueba le será entregado un **Consentimiento Informado** sin cuya firma no podrá realizarse dicha prueba.