



<ul style="list-style-type: none"><li><b>Poltsa amniotikoa hausten bada, jaioberriak infekzioa izateko arriskua % 1eko da, aldiz, poltsa amniotikoa osorik dagoenean, % 0,5ekoa da.</b></li><li><b>Poltsa amniotikoa hautsi zaien emakumeen % 60 lehenengo 24 orduetan hasten da erditzen.</b></li><li><b>Denbora-tarte hori pasa ondoren, erditzea eragitea (indukzioa) gomendatzen da.</b></li><li><b>Gorputz temperatura 4 orduz behin neurtea gomendatzen da, gaueko atsedena errespetatuz.</b></li><li><b>Bainua edo dutxa hartzeak ez du infekzio arriskua areagotzen. Harreman sexualak izateak arriskua areagotu lezake.</b></li><li><b>Joan zaitez berriro Larrialdietara, baldin eta:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Temperatura &gt;37.5º.</li><li>- Likido amniotikoa tindatua badago edo ezohiko usaina badu.</li><li>- Baginako odoljario aktiboa bada.</li><li>- Haurraren mugimenduak gutxitzen badira.</li><li>- Erditze kontrakzioekin hasten bazara.</li></ul></li><li><b>Poltsa apurtu eta 18-24 ordu pasata ez bada erditzea hasi, Larrialdietara joan zaitez haurraren bihotz-maiztasuna auskultatzeko eta indukziorako edo indukziorako hitzordua programatzeko (poltsa amniotikoaren haustura orduaren arabera izango da).</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>El riesgo de Infección neonatal en Rotura Prematura de Membranas (RPM) es del 1%, frente al 0,5% en partos con bolsa integra.</li><li>El 60% de las mujeres con RPM inician el parto en las primeras 24 horas.</li><li>Pasado este periodo se recomienda la inducción del parto.</li><li>Tomar la temperatura cada 4 horas respetando el descanso nocturno.</li><li>Tomar un baño o ducha no aumenta el riesgo de infección, pero mantener relaciones sexuales podría hacerlo.</li><li>Acudirá de nuevo a Urgencias si:<ul style="list-style-type: none"><li>- Temperatura &gt;37.5º.</li><li>- Líquido teñido u olor anormal.</li><li>- Sangrado vaginal activo.</li><li>- Disminución de movimientos fetales.</li><li>- Dinámica uterina de parto.</li></ul></li><li>Transcurridas 18-24 horas desde la RPM, si no se ha iniciado el parto, acudirá a Urgencias para la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal e inducción o programar cita para la inducción (en función de la hora de RPM).</li></ul>
--	---