



KARDIOBERSIOA CARDIOVERSION

- Medikazio lasaigarria eman behar izan dizugu miaketa endoskopikoaren aurretik; hori dela-eta, zure erreflexuak lasaigarrien eraginpean egon daitezke zenbait orduan miaketaren ostean.
- Garrantzi handikoa da hurrengo aholkuak kontuan hartzea, miaketaren ondoko bilakaera behar bezala joan dadin.

GOMENDIOAK

1. Ez hartu edari alkoholdunik.
2. Miaketaren ostean, 24 ordu pasatu arte, ez gidatu inolako ibilgailurik, ezta makinarik erabili ere.
3. Zure suspertze-aldian edozein anomalia gertatuz gero, emaiozu horren berri zure medikuari edo ospitalekoiei.
4. Ez hartu erabaki garrantzitsurik hurrengo 24 orduetan, ondo sentitu arren.

- A usted se le ha realizado una cardioversión en la que ha sido necesario administrarle medicación sedante que puede alterar sus reflejos durante varias horas después de su administración.
- Es muy importante que usted entienda y ponga en práctica las siguientes instrucciones y así ayude al éxito de su exploración

RECOMENDACIONES

1. No ingerir bebidas alcohólicas.
2. No puede conducir ninguna clase de vehículos ni utilizar maquinarias hasta pasadas 24 horas de la exploración.
3. Notifique al Hospital o a su médico la aparición de una situación anormal en su recuperación.
4. No tome decisiones importantes al menos durante 24 horas, aunque Vd. Se sienta en un estado normal.