BULARREKO HAURRAREN SUKARRA / OBSERVACION DOMICILIARIA DEL LACTANTE FEBRIL

Haur txikiek sukar altua dutenean, sintoma kezkagarria izaten da gurasoentzat, baina, gehienetan, sukarraren arrazoia gaixotasun biriko bat izaten da, eta ez du eragin handirik haurraren osasunean. Normalean, gaixotasunaren eboluzioa bera garrantzizko datua izaten da pediatrok diagnostiko egokia egin ahal izateko, sintoma edo zeinu berriak ere kontuan hartuta.

Haurra xehetasunez aztertu ondoren, ez dugu gaixotasun larriren baten seinalerik aurkitu, eta egokia iruditzen zaigu etxea bidaltzea. Etxean bere guraso edo tutoreek ardura handiarekin zaindu behar dute haurra, eta ondoko jarraibideak bete:

1. 3 orduz behin, haurraren tenperatura hartu eta nola dagoen ikusi
2. Pediatrak agindutako medikazio antitermikoa eman
3. Berriro etorri beste ebaluazio bat egiteko, hauetako sintomaren bat badu:

- Orban gorrixkak larruazalean
- Etengabeko gonbitoak
- Gehiegizko lokartzea

Zure pediatrarengana joan 24-48 ordu pasatu ondoren, beste azterketa bat egiteko.

Aunque la fiebre elevada en los niños pequeños es un síntoma alarmante para los padres, en la inmensa mayoría de los casos se corresponde con una enfermedad vírica que no repercutirá de forma importante en la salud de su hijo/a. Habitualmente, la propia evolución de la misma es fundamental para que los Pediatras podamos hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad ayudados por la aparición de nuevos síntomas o signos.

Tras haber examinado minuciosamente a su hijo/a no hemos encontrado señales de enfermedad grave y consideramos adecuado que el paciente sea remitido su domicilio bajo la atenta supervisión de sus padres o tutores con estas recomendaciones:

1. Compruebe la temperatura y el estado de su hijo cada 3 horas.
2. Administre la medicación antitérmica indicada por el pediatra.
3. Si observa algunos de estos síntomas acuda para una nueva evaluación:

- Manchas rojizas en la piel
- Vómitos continuos
- Adormecimiento excesivo

Acuda a una nueva evaluación por su pediatra en 24 – 48 h