



LAPAROSKOPIA LAPAROSCOPIA

LAPAROSKOPIA egin dizute (DIAGNOSTIKOA eta/edo MIAKETAKOA), eta beharrezkoa izan da sedatzeko medikazioa ematea. Horren ondorioz, baliteke gorabeherak nabaritzea erreflexuetan ordu batzuetan zehar.

Oso garrantzitsua da jarraibide hauek ondo irakurtzea eta betetzea.

Zure medikuari abisatu beharko diozu honelakorik gertatuz gero:

- ☞ Odol jario handia
- ☞ Hantura
- ☞ Sukarra (38° C-tik gorakoa)
- ☞ Min handia
- ☞ Hotzikarak

Apurka-apurka zure ohiko dietara bueltatu. Hasi likidoak hartzen eta janari solidoa hartzeari pixkanaka ekin

1. Sendaketa lokala Betadinez, 24 ordurik behin.
2. Konplikaziorik egon ezean, 7 egunen buruan jostura-puntuak kendu zure anbulatorioan.
3. Atsedean erlatiboa hartu puntuak kendu arte.
4. Ez altxatu pisurik puntuak kendu arte.
5. Minik sentituz gero, normalean hartzen duzun analgesikoa har dezakezu.
6. Astebetean edo aste bitan ez izan harreman sexualik.
7. Puntuak kendu ostean, ohiko bizimoduari ekin, norberaren egoeraren arabera betiere.
8. Biopsia egin eta 48 ordura dutxatu ahal izango zara, baina puntuak ONDO SIKATU eta apositu garbi bat jarri beharko duzu

A usted se le ha realizado una LAPAROSCOPIA (DIAGNOSTICA y/o EXPLORATORIA en la que ha sido necesario administrarle medicación sedante que puede alterar sus reflejos durante varias horas después de su administración.

Es muy importante que usted entienda y ponga en práctica las siguientes instrucciones

Es necesario que avise a su médico en caso de:

- ☞ Sangrado excesivo
- ☞ Inflamación
- ☞ Fiebre (más de 38° C)
- ☞ Excesivo dolor
- ☞ Escalofríos

Vuelva a su dieta de manera gradual. Empiece tomando líquidos e introduzca progresivamente los alimentos sólidos.

1. Cura local con BETADINE cada 24 h.
2. Retirar puntos de sutura en su ambulatorio al 7º día, si no hay complicaciones.
3. Reposo relativo hasta retirar puntos.
4. No coger pesos hasta retirar los puntos.
5. Si tiene dolor puede tomar el analgésico que utilice habitualmente
6. No mantener relaciones sexuales en un plazo de 1-2 semanas.
7. Tras retirar puntos iniciar actividad normal según se encuentre.
8. Puede ducharse a las 48 h. De la intervención teniendo precaución de SECARSE BIEN los puntos y poner apósito limpio.